

- 問1 強迫性障害の入院患者。医師に指示された回数を超えて手を洗い続けている。看護師として適切な対応はどれか。
- 問2 障害と治療薬の適切な組み合わせはどれか。
- 問3 退院前の統合失調症患者に対して、退院後の薬物治療の中断を防ぐのに有用なものとはどれか。
- 問4 抗精神病薬の副作用はどれか
- 問5 うつ病患者への適切な対応はどれか。
- 問6 「振戦せん妄」はどれか。
- 問7 アルコールや睡眠薬の離脱症状はどれか。
- 問8 思考〇〇、適切な組み合わせはどれか。
- 問9 注意欠如多動性障害で生じうる症状はどれか。
- 問10 (短時間型の睡眠薬よりも)長時間型の睡眠薬で生じやすいのはどれか。
- 問11 不安障害の名称と症状、適切な組み合わせはどれか。
- 問12 不眠を訴える老人への適切な生活指導はどれか。
- 問13 パニック障害で生じる症状はどれか。
- 問14 神経伝達物質と精神疾患の適切な組合せはどれか。
- 問15 睡眠時無呼吸症候群で生じる症状はどれか。
- 問16 抗精神病薬による錐体外路症状につき適切な組み合わせはどれか。
- 問17 てんかんの診断に有用な検査はどれか。
- 問18 陰性症状はどれか。
- 問19 神経伝達物質と精神疾患の適切な組合せはどれか。
- 問20 自閉スペクトラム症の症状はどれか。
- 問21 興奮する患者への適切な対応はどれか。
- 問22 ナルコレプシーの症状はどれか。
- 問23 長期間の飲酒で生じる〇〇症候群はどれか。
- 問24 境界性パーソナリティ障害の特徴はどれか。
- 問25 精神疾患と治療薬の適切な組合せはどれか。
- 問26 〇〇症につき適切な組合せはどれか。
- 問27 レビー小体型認知症の症状はどれか。
- 問28 心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉について適切なものはどれか。
- 問29 妄想〇〇につき適切な組み合わせはどれか。
- 問30 症状とその説明の適切な組み合わせはどれか。
- 問31 神経性やせ症で生じる症状はどれか
- 問32 神経性やせ症で生じる身体の症状または所見はどれか。
- 問33 うつ病患者への適切な対応はどれか。
- 問34 注意欠如多動性障害について適切なものはどれか。

- 問35 障害と治療薬の適切な組み合わせはどれか。
- 問36 妄想に苦しむ患者への適切な対応はどれか。
- 問37 内／外／心因性、適切な組み合わせはどれか。
- 問38 てんかんの患者が強直間代発作発作を起こしているところを目撃した。適切な対応はどれか。
- 問39 自動車事故の後、心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉を発症した人への看護師の適切な対応はどれか。
- 問40 うつ病で生じやすい妄想はどれか。
- 問41 神経性やせ症の患者が「おとなになりたくない」と訴え、食後にトイレにこもったのち嘔吐したことを自ら報告した。適切な対応はどれか。
- 問42 アルツハイマー型認知症について適切なものはどれか。
- 問43 （解離症／解離性障害ではなく）変換症／転換性障害のはどれか。
- 問44 強迫性障害の正しい治療はどれか。
- 問45 躁状態の症状はどれか。
- 問46 夜間せん妄の患者の看護で適切なものはどれか。
- 問47 ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の副作用はどれか。
- 問48 ○○妄想とその説明、適切な組み合わせはどれか。
- 問49 適切な組み合わせはどれか。
- 問50 せん妄について適切なものはどれか。